

SCHEDA TECNICA – BRODIMADIRAT FORTE Y – YOREN

1. Composizione

Il prodotto è formulato con **Brodifacoum** (CAS 56073-07-5) nella concentrazione di **0,005 g per 100 g di esca**, un anticoagulante altamente efficace nel controllo delle popolazioni di roditori. Contiene inoltre **Denatonium Benzoate** (0,001 g per 100 g di prodotto), un agente amaricante che riduce il rischio di ingestione accidentale. La formulazione è completata da coformulanti selezionati per garantire la stabilità e l'appetibilità dell'esca.

2. Sostanza attiva

Principio attivo: **Brodifacoum**, rodenticida ad azione anticoagulante.

3. Caratteristiche del prodotto

BRODIMADIRAT FORTE Y è un'esca rodenticida pronta all'uso, sviluppata con una base di **semi di girasole**, un'esca particolarmente attrattiva per topi e ratti. Il prodotto è destinato all'impiego da parte di **operatori professionali** e deve essere utilizzato esclusivamente secondo le normative vigenti in materia di controllo dei roditori.

4. Spettro d'azione

Il prodotto è indicato per il controllo delle seguenti specie infestanti:

- **Mus musculus** (topo domestico), adulti e giovani;
- **Rattus norvegicus** (ratto grigio), adulti e giovani;
- **Rattus rattus** (ratto nero), adulti e giovani.

5. Aree di impiego

L'esca può essere utilizzata in **ambienti interni ed esterni**, esclusivamente all'interno di **contenitori per esche a prova di manomissione**, al fine di garantire la sicurezza per specie non bersaglio e ridurre i rischi di esposizione accidentale.

6. Modalità di impiego

L'esca deve essere collocata nelle **aree frequentate dai roditori**, in prossimità di tane, percorsi abituali o punti di alimentazione. È necessario effettuare un monitoraggio regolare: inizialmente ogni **2-3 giorni**, e successivamente almeno una volta alla settimana. Le esche consumate o deteriorate devono essere sostituite per mantenere l'efficacia del trattamento.

7. Dosi di impiego

- **Per il controllo dei ratti:** applicare **100-200 g di esca per punto esca**, con una distanza minima tra i punti di **10-20 metri** in caso di infestazione moderata e di **3-10 metri** in caso di infestazione elevata.
- **Per il controllo dei topi:** utilizzare **20 g di esca per punto esca**, posizionando i punti esca a una distanza di **5-20 metri** per infestazioni di bassa entità e **2-5 metri** per infestazioni elevate.
- Il consumo dell'esca deve essere monitorato regolarmente: qualora venga interamente consumata in breve tempo, si rende necessario il ripristino dell'esca fino al completo controllo dell'infestazione.