BRODIMADIRAT FORTE Y

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Esca rodenticida pronta all'uso a base di semi di girasole

1 – COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (CAS 56073-10-0): 0,005 g

Denatonium Benzoate (agente amaricante): 0,001 g

Calce idrata – calcio idrossido (CAS 1305-62-0): 0,35 - 0,40 g

Bronopol (CAS 52-51-7): 0,05 - 0,1 g

Coformulanti selezionati: q.b. a 100 g

2 – SOSTANZA ATTIVA

Brodifacoum, rodenticida anticoagulante di seconda generazione.

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, formulata su matrice di semi di girasole.

Aroma burro altamente attrattivo per topi e ratti.

Contiene un agente amaricante (Denatonium Benzoate), sostanza particolarmente amara che riduce il rischio di ingestione involontaria da parte dei bambini e delle specie non bersaglio.

4 – SPETTRO D'AZIONE

Indicato per il controllo delle seguenti specie infestanti (adulti e giovani):

Topo domestico (*Mus musculus*).

Ratto grigio (*Rattus norvegicus*).

Ratto nero (*Rattus rattus*).

5 – AREE DI IMPIEGO

L'esca può essere utilizzata in:

Ambienti interni.

Ambienti esterni.

Nota vincolante: utilizzare esclusivamente all'interno di contenitori per esche a prova di manomissione e debitamente marcati, al fine di garantire la sicurezza per le specie non bersaglio e ridurre i rischi di esposizione accidentale.

6 – MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca deve essere collocata nelle aree frequentate dai roditori e sottoposta a monitoraggio periodico.

POSIZIONAMENTO E MONITORAGGIO

Collocare i punti esca in prossimità di tane, percorsi abituali o punti di alimentazione. È necessario effettuare un monitoraggio regolare delle stazioni: inizialmente ogni 2-3 giorni, e successivamente almeno una volta alla settimana. Sostituire le esche consumate o deteriorate per mantenere l'efficacia del trattamento. Qualora l'esca venga interamente consumata in breve tempo, si rende necessario il ripristino fino al completo controllo dell'infestazione.

Il prodotto non è destinato a un uso permanente: organizzare trattamenti della durata massima di 6 settimane. Al termine del trattamento smaltire le esche residue e i contenitori secondo le norme vigenti.

7 – DOSI DI IMPIEGO

TRATTAMENTI PER IL CONTROLLO DEI RATTI

Dosaggio: applicare 100 - 200 g di esca per punto esca.

Distanza (infestazione moderata): posizionare i punti esca a una distanza di 10 - 20 metri.

Distanza (infestazione elevata): ridurre la distanza tra i punti esca a 3 - 10 metri.

TRATTAMENTI PER IL CONTROLLO DEI TOPI

Dosaggio: utilizzare 20 g di esca per punto esca.

Distanza (bassa entità): posizionare i punti esca a una distanza di 5 - 20 metri.

Distanza (infestazione elevata): ridurre la distanza tra i punti esca a 2 - 5 metri.

8 – REGISTRAZIONE

Prodotto rodenticida per uso professionale.

L'impiego deve essere rigorosamente conforme alle normative vigenti in materia di controllo dei roditori.

Prodotto biocida (PT14) – Autorizzazione del Ministero della Salute n. **IT/2023/00851/AUT**.

9 – SIMBOLI DI PERICOLO



PERICOLO

Pittogramma GHS08 – Pericolo per la salute.

10 – INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

H360D: Può nuocere al feto.

H373: Può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501: Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Contiene: BRODIFACOUM.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Meccanismo d'azione: Il Brodifacoum è un anticoagulante cumarinico, antagonista della vitamina K: inibisce la sintesi dei fattori della coagulazione vitamina K dipendenti.

L'effetto anticoagulante si instaura generalmente dopo 12-18 ore, raggiunge il picco dopo 36-48 ore e può persistere per diversi giorni. Possibili sintomi: emorragie gengivali, epistassi, ipotensione, tachicardia, ematuria.

In caso di esposizione, ingestione accidentale o sospetto avvelenamento, contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico mostrando la confezione. Controllare ripetutamente l'attività protrombinica. **Antidoto specifico: Vitamina K1.**

12 – AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non disperdere assolutamente l'esca libera nell'ambiente: molto pericoloso per l'ambiente.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali. Particolare attenzione va posta alle donne in gravidanza: il prodotto può nuocere al feto.

Evitare di toccare il prodotto a mani nude: maneggiarlo utilizzando guanti protettivi idonei. Non respirare la polvere.

Raccogliere i roditori morti durante le ispezioni, indossando guanti, e smaltirli secondo le norme previste; non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche.

Conservare nella confezione originale, lontano da alimenti, bevande e mangimi, dal calore e dalle fiamme libere.

13 – CONFEZIONE

Sacco da 20 kg

14 – COMPATIBILITÀ

La matrice a base di semi di girasole è ideale per l'uso in ambienti in cui i roditori sono già abituati a nutrirsi di granaglie o semi, ottimizzando l'adescamento rispetto ad altre fonti alimentari concorrenti.

15 – INFORMAZIONI

Prodotto commercializzato e distribuito da **Natural Trade S.r.l.** con marchio YOREN.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Classificazione, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e composizione conformi alla Scheda di Dati di Sicurezza del prodotto (Reg. CE 1272/2008 – CLP). Revisione: ottobre 2026.