YORMIX

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Esca rodenticida pronta all'uso in mix di spezzato e fioccato di mais

1 – COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Bromadiolone (CAS 28772-56-7): 0,005 g
Denatonium Benzoato (agente amaricante): 0,001 g
Calce idrata – calcio idrossido (CAS 1305-62-0): 0,30 - 0,35 g
Bronopol (CAS 52-51-7): 0,05 - 0,1 g
Coformulanti e sostanze appetibili: q.b. a 100 g

2 – SOSTANZA ATTIVA

Bromadiolone, rodenticida ad azione anticoagulante.

3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Esca rodenticida idrorepellente pronta all'uso a base di Bromadiolone.
Formulazione aromatica al cioccolato miscelata con strutto per esaltarne il sapore.
Contiene miscele di prima qualità che rimangono fragranti per lungo tempo.
Include un agente amaricante (Denatonium Benzoato) per prevenire l'ingestione accidentale.
Prodotto a base di mais spezzato e fioccato, ideale in ambito zootecnico e negli allevamenti.

4 – SPETTRO D'AZIONE

Indicato per il controllo delle seguenti specie infestanti (adulti e giovani):
Topo domestico (*Mus musculus*).
Ratto grigio (*Rattus norvegicus*).
Ratto nero (*Rattus rattus*).

5 – AREE DI IMPIEGO

L'esca può essere utilizzata in:
Ambienti interni.
Ambienti esterni.
Nota vincolante: utilizzare esclusivamente all'interno di contenitori per esche a prova di manomissione e debitamente marcati, al fine di garantire la sicurezza per le specie non bersaglio e ridurre i rischi di esposizione accidentale.

6 – MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca deve essere collocata nelle aree frequentate dai roditori e sottoposta a monitoraggio periodico.

POSIZIONAMENTO E MONITORAGGIO

Collocare i punti esca in prossimità di tane, percorsi abituali o punti di alimentazione. È necessario effettuare un monitoraggio regolare delle stazioni: inizialmente ogni 2-3 giorni, e successivamente almeno una volta alla settimana. Sostituire le esche consumate o deteriorate per mantenere l'efficacia del trattamento. Qualora l'esca venga interamente consumata in breve tempo, si rende necessario il ripristino fino al completo controllo dell'infestazione.

Il prodotto non è destinato a un uso permanente: organizzare trattamenti della durata massima di 6 settimane. Al termine del trattamento smaltire le esche residue e i contenitori secondo le norme vigenti.

7 – DOSI DI IMPIEGO

TRATTAMENTI PER IL CONTROLLO DEI RATTI

Dosaggio: applicare 60 - 100 g di esca per punto esca.

Distanza (infestazione moderata): posizionare i punti esca a una distanza di 10 - 20 metri.

Distanza (infestazione elevata): ridurre la distanza tra i punti esca a 3 - 10 metri.

TRATTAMENTI PER IL CONTROLLO DEI TOPI

Dosaggio: utilizzare 40 g di esca per punto esca.

Distanza (bassa entità): posizionare i punti esca a una distanza di 5 - 20 metri.

Distanza (infestazione elevata): ridurre la distanza tra i punti esca a 2 - 5 metri.

8 – REGISTRAZIONE

Prodotto rodenticida per uso professionale.

L'impiego deve essere rigorosamente conforme alle normative vigenti in materia di controllo dei roditori.

Prodotto biocida (PT14) – Autorizzazione del Ministero della Salute n. **IT/2014/00250/AUT**.

9 – SIMBOLI DI PERICOLO



PERICOLO

Pittogramma GHS08 – Pericolo per la salute.

10 – INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

H360D: Può nuocere al feto.

H372: Provoca danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P260: Non respirare la polvere.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti protettivi.

P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P501: Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Contiene: BROMADIOLONE.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Meccanismo d'azione: Il Bromadiolone è un anticoagulante cumarinico, antagonista della vitamina K: inibisce la sintesi dei fattori della coagulazione vitamina K dipendenti.

L'effetto anticoagulante si instaura generalmente dopo 12-18 ore, raggiunge il picco dopo 36-48 ore e può persistere per diversi giorni. Possibili sintomi: emorragie gengivali, epistassi, ipotensione, tachicardia, ematuria.

In caso di esposizione, ingestione accidentale o sospetto avvelenamento, contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico mostrando la confezione. Controllare ripetutamente l'attività protrombinica. **Antidoto specifico: Vitamina K1.**

12 – AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Non disperdere assolutamente l'esca libera nell'ambiente.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali. Particolare attenzione va posta alle donne in gravidanza: il prodotto può nuocere al feto.

Evitare di toccare il prodotto a mani nude: maneggiarlo utilizzando guanti protettivi idonei. Non respirare la polvere.

Raccogliere i roditori morti durante le ispezioni, indossando guanti, e smaltirli secondo le norme previste; non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche.

Conservare nella confezione originale, lontano da alimenti, bevande e mangimi, dal calore e dalle fiamme libere.

13 – CONFEZIONE

Fusto da 10 kg

14 – COMPATIBILITÀ

La miscela idrorepellente di spezzato e fioccato di mais è ideale per gli ambienti ad alta umidità tipici del settore zootecnico. Riduce il degradamento dell'esca dovuto all'acqua o alle deiezioni animali.

15 – INFORMAZIONI

Prodotto commercializzato e distribuito da **Natural Trade S.r.l.** con marchio YOREN.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Classificazione, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e composizione conformi alla Scheda di Dati di Sicurezza del prodotto (Reg. CE 1272/2008 – CLP). Revisione: ottobre 2026.